

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 22-4-70 050213

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 3 AU BULLETIN N° 115 d'AVRIL 1970

17 avril 1970/N° 7

## ARBORICULTURE FRUITIERE

### AVERTISSEMENTS-

#### Tavelure du pommier :

A la faveur d'une hausse des températures journalières, le départ en végétation des arbres fruitiers va s'accroître dans les prochains jours. Toutes les variétés qui atteindront le stade C3 (bourgeon éclatant) devront être l'objet d'une première protection anti-tavelure ; en effet les premières projections d'ascospores ont été observées, en laboratoire, en moins d'une heure.

Si nous bénéficions dans les jours à venir d'une période sèche, une projection d'ascospores aura lieu lors des prochaines pluies amenant un risque d'infection primaire sur les variétés les plus développées.

Ce traitement pourra être encore effectué à l'aide de sels de cuivre, si le traitement de pré-débourrement n'a pu être jusqu'ici réalisé, sinon à l'aide d'un fongicide organique de synthèse.

#### Tavelure du poirier :

Une nouvelle protection est à assurer en fonction de la date du dernier traitement et de la pluviométrie de ces derniers jours.

### INFORMATIONS.-

#### Oïdium du pommier :

La protection oïdium doit débuter de bonne heure. Ajouter à la bouillie anti-tavelure un fongicide spécifique de l'oïdium.

#### Monilia des cerisiers :

Dans l'ensemble des vergers un traitement cuprique a déjà été réalisé. En fonction de la date de ce traitement, de la sensibilité au monilia de certaines variétés et des pluies survenues ces derniers jours, une nouvelle protection doit avoir lieu avant le stade D (bouton blanc) si ce stade est déjà atteint dans quelques situations particulières employer de préférence un fongicide organique de synthèse, afin d'éviter les risques de phytotoxicité.

#### Puceron vert du pommier :

Les toutes premières éclosions sont apparues, on peut cependant retarder le traitement jusqu'au prochain avis pour les combattre.

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

Imprimerie de la Station de CHAMPAGNE - Directeur-Gérant L. BOUYX

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytopathologique "CHAMPAGNE"

J. DELATTRE.

P 311